

FICHA TÉCNICA



FUNGICIDA AGRÍCOLA

REGISTRO DE VENTA ICA No. PL0001592023

A NOMBRE DE EUROFERT COLOMBIANA S.A.S

Empresa formuladora	Jiangsu Mindleader Crop Science Co., Ltd 9 KongLin Road, Huaian Salt New Material Industrial Park,
Tipo de producto	Fungicida agrícola
Ingrediente activo	Propiconazole CAS RN 60207-90-1 Azoxystrobin CAS RN 131860-33-8
Composición	Propiconazole 185 g/L + Azoxystrobin 110 g/L
Formulación	SE – Suspoemulsión
Grupo químico	Triazol + Estrobilurina
Categoría toxicológica	II-MODERADAMENTE PELIGOROSO-DAÑINO
Presentaciones	500 cc – 1 L

GENERALIDADES

PILARPRO® es un fungicida de amplio espectro, el cual presenta modo de acción sistémico y preventivo, cuyo ámbito de aplicación es a campo abierto o invernadero por aplicación foliar.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- La formulación Suspoemulsión SE de **PILARPRO®** es una de las formulaciones más avanzadas, tiene rápida absorción en los cultivos y resistencia a lluvia.
- La mezcla de Propiconazol con Azoxystrobin de **PILARPRO®** alcanzan un coeficiente sinérgico hasta 145%.

Eurofert Colombiana S.A.S.

Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78
Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34

FICHA TÉCNICA



- **PILARPRO®** posee dos ingredientes activos con mecanismo de acción diferentes, (P y C) que disminuye el efecto de resistencia en patógenos.
- **PILARPRO®** tiene alta actividad fungicida, efecto notable en las manchas foliares debido al movimiento sistémico de ambos ingredientes activos

MODO DE ACCIÓN

El propiconazole tiene acción sistémica y translaminar, inhibe una enzima específica, la C14-desmetilasa, que desempeña un papel en la producción de esteroides. Los esteroides, como el ergosterol, son necesarios para la estructura y función de la membrana, mientras que Azoxystrobin es inhibidor de la respiración (fungicida QoL).

RECOMENDACIONES DE USO

No aplique cuando las condiciones favorezcan la deriva del producto (vientos fuertes) o con equipo de aplicación defectuoso. No descargue residuos del producto en fuentes de agua ni en el sistema de alcantarillado. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Cultivo	Plagas	Dosis	P.R. (Horas)
Arroz	Complejo Manchado de Grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Curvularia</i> sp, <i>Sphaerulina</i> sp, <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i>)	0,6 L/ha	4
Banano	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,4 L/ha	4
P.R. Periodo de reingreso			

FRECUENCIA DE APLICACIONES

Arroz: Realizar mínimo una aplicación del producto **PILARPRO®**, procurando una aspersion homogénea, con una incidencia de la enfermedad entre el 5 y el 10%. Banano: Realizar mínimo una aplicación del producto **PILARPRO®** dirigida al follaje de la planta, cuando se empiecen a observar los primeros síntomas ocasionados por la enfermedad.

FICHA TÉCNICA



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evítese los productos fuertemente ácidos o alcalinos. En caso de duda efectuar una prueba a pequeña escala.

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Retire al paciente a un lugar fresco, seco y con mayor ventilación. Manténgalo en reposo y vigile la respiración.
Contacto con los ojos	Lave inmediatamente los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Si la irritación aumenta llevar al paciente a un hospital.
Contacto con la piel	Quítese las prendas contaminadas y lave inmediatamente con suficiente agua y jabón.
Ingestión	Si la persona esta consiente y su respiración es normal del agua, si hay vómito mantenga la cabeza debajo de la cadera para evitar bronco aspiración, si la persona esta inconsciente NO INDUZCA AL VÓMITO ni suministre nada oralmente, en cualquier caso, obtenga atención médica inmediata.
Nota al médico	El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. NUNCA SUMINISTRE NADA POR VÍA ORAL A UNA PERSONA INCONSCIENTE.



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo

Lea la etiqueta antes de usar. Evite el contacto con la piel y los ojos. No aspire el asperjado. Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar. Lavarse la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. No continúe usándolo si ocurre irritación dermal o sangrado nasal. Mantener el envase bien cerrado cuando no está en uso. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Siga las medidas de protección

Eurofert Colombiana S.A.S.

**Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78
Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34**

FICHA TÉCNICA



personal dadas en la Sección 8. Retirarse la ropa inmediatamente si el pesticida la contamina. Luego bañarse y ponerse ropa limpia. Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos.

Almacenamiento

Mantenga bajo llave. Mantenga en su envase original, bien cerrado, fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Proteger de las heladas. La vida de almacenamiento por lo menos 2 años si está almacenado en el recipiente original sin abrir a temperatura ambiente.

“DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.”

Agente Para Recolección de Envases: COLECTA Tel.: (+ 57 1) 704 3399 (+ 57) 321 452 0553. Carrera 22 No. 81 – 80 Of. 401 Bogotá D.C., Colombia. E-mail servicio al cliente: info@colecta.org

TITULAR DE REGISTRO

EUROFERT COLOMBIANA S.A.S

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Eurofert Colombiana S.A.S.

Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78

Teléfonos: (57+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34

Eurofert Colombiana S.A.S.

Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78

Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34